



Dr. med. Christian Riethe
 Facharzt für Allgemeinmedizin
 Notfall- und Palliativmedizin

BSNR: 618519200
 LANR: 208560101
 Akademische Lehrpraxis der Universität Ulm

Härtsfeldstrasse 12
 D- 73441 Bopfingen
 Tel.: 07362/3811
 Fax.: 07362/921246
 e-mail: arzt@drriethe.de
www.DrRiethe.de

Schutzimpfungen 2017

Krankheit	Vorkommen	Übertragung	Empfehlung	Impfstoff	Impfschutz
Basis-Impfungen					
Tetanus- Diphtherie (Wundstarrkrampf)	Weltweit	Tetanus: Wunden Diphtherie: Tröpfchen	Für jeden Für jede Reise	Td-Rix [®] Td-pur [®]	10 Jahre
Polio (Kinderlähmung)	Asien, Afrika (Europa)	Fäkal-oral	Für jeden 4x, wiederh. für alle berufl. Exponierten u.Reisen in Risikogebiete	REVAXIS [®] (Td+Polio) IPV Merieux [®]	10 Jahre (Auffrischung bei Expositionsrisiko)
Pertussis (Keuchhusten)	Weltweit;	Tröpfchen	Für jeden 1x (mit Td), wiederh. für alle mit Kontakt zu Kleinkindern etc.	Repevax [®] (TdP+Pert.) Covaxis [®] (Td+Pertussis)	10 Jahre (Auffrischung bei Expositionsrisiko)
Masern-Mumps-Röteln (Lebendimpfstoff)	Weltweit;	Tröpfchen	Für jeden 2x, (>18 J. min.1x), jg. Frauen 2x Rö; 3 Mo. n. Impfung keine Schwangerschaft!	Priorix [®]	Nach zwei Impfungen lebenslang
Influenza (Grippe)	Weltweit;	Tröpfchen	Für jeden > 60 Jahre, alle anderen m. bes. Gefährdung	Influvac [®] , Xanaflu [®] Mu-tagrip [®]	1 Jahr
Pneumokokken (Lungenentzündung)	Weltweit;	Tröpfchen	Für jeden > 60 Jahre, alle anderen m. bes. Gefährdung (z.B. chron. Kranke)	Prevenar 13 [®] Pneumovax [®]	6 Jahre (Auffrisch. nur bei bes. Gefährdung)
FSME („Zecken“-Frühsommer-Meningoenzephalitis)	Risikogebiete in Deutschland, Schweiz, Österreich, Mittel- und Osteuropa, Schweden	Zecken	Wanderer, Sportler und Berufsgruppen mit viel Waldaufenthalt in FSME-Risiko-Gebieten	Encepur [®] FSME-Immun [®]	5 Jahre (> 60-jähr.: 3 Jahre) Grundimpfung: 3 Impfungen 0-1-9 Mo. (1.Auffrisch. n. 3 Jahren)
Hepatitis B (Serum Gelbsucht)	Weltweit	Blut, Geschlechtsverkehr	Alle Säuglinge. Längere / wiederholte Aufenth. i. Entwicklungsländern, Medizin- u. andere Risikopersonen	Engerix-B [®]	lebenslang (b. spez. Risiko AK-Test) Grundimpf.: 3 Impf. 0-1-6 Monate Schnell: 4 Impf.:0-7-21Tage-12 Mo.
Hepatitis-A+B (Kombi-Impfung)	Weltweit	Fäkal-oral bzw. Blut/Geschlechtsverk.	Hep.-B Indikation und gleichzeitig Hepatitis-A-Expositionsrisiko	Twinrix [®] A/B	>10 Jahre (bei spez. Risiko AK-Test) Grundimpf.: 3 Impf. 0-1-6 Monate Schnell: 4 Impf.:0-7-21Tage-12 Mo.

Bankverbindung:
 Dt. Apo- und Ärztebank, Stuttgart, BLZ 60090609, Kto. 0007746598
 Sepa: BIC: DAA ED EDD, IBAN: DE42300606010007746598
 Bopfinger Bank, BLZ 60069239, Kto. 11698004
 Sepa: BIC: GENODES1BPF, IBAN: DE59600692390011698004



Dr. med. Christian Riethe

Facharzt für Allgemeinmedizin
Notfall- und Palliativmedizin

BSNR: 618519200

LANR: 208560101

Akademische Lehrpraxis der Universität Ulm

Härtsfeldstrasse 12
D- 73441 Bopfingen

Tel.: 07362/3811

Fax.: 07362/921246

e-mail: arzt@drriethe.de

www.DrRiethe.de

Reiseimpfungen

Reiseimpfungen						
Hepatitis A (Infektiöse Gelbsucht)	Weltweit, sehr häufig in Entwicklungsländern	Fäkal-oral*	Für jede Reise in Tropen und Subtropen (Südeuropa)	Havrix®	>25 Jahre Grundimpfung: 2 Impfungen 0 - 6 Monate	
Typhus (Abdominal-)	Weltweit, häufig in Entwicklungsländern	Fäkal-oral	Für längere Reisen, speziell unter nicht optimalen hygienischen Verhältnissen	Typhim Vi® Viatim® (Typhus+Hep-A)	Injektion 3 Jahre	
Gelbfieber (Lebendimpfstoff)	Tropisches Afrika und Südamerika	Tagaktive Mücken	Für Reisen in betroffene Gebiete (teilweise obligatorisch)	Stamaril®	Lebenslang	
Meningokokken-Meningitis (Hirnhautentzündung)	Weltweit, häufig Epidemien im Meningitis-Gürtel: (z.B. Sahel)	Tröpfchen	Für längere Aufenthalte in Risikogebieten (obligat. nach Mekka)	Menveo® Nimenrix®	Schutzdauer unbekannt	
Tollwut	Weltweit	Tierbiß, Körperflüssigkeiten infizierter Tiere	Langzeitaufenthalt, spezielle Berufsgruppen, in Risikogebieten wenn keine postexpo. Impf. mögl.	Rabipur® Tollwut-HDC®	2 bis 5 Jahre Grundimpfung: 0-7-21 Tage	
Japanische Enzephalitis (Hirnentzündung)	Südostasien, Indien, Südnapal, Ozeanien	Nachtaktive Mücken	Für Aufenthalte > 4-6 Wochen zur Risikozzeit in Risikogebieten	Ixiaro®	Schutzdauer unbek., 1. Auffr. 1-2 J. Grundimpf.: 2 Impf. 0-28 (0-7)Tage	
Cholera (Lebendimpfstoff)	Weltweit (bei Epidemien)	Fäkal-oral	Selten nötig: Cholera-Ausbrüche z.B. in Flüchtlingslagern/f. Katastrophenhelfer	Dukoral®	Schluckimpfung 2 Jahre Grundimpfung: 2 Dosen: 0-7 Tage.	

Bankverbindung:

Dt. Apo- und Ärztebank, Stuttgart, BLZ 60090609, Kto. 0007746598

Sepa: BIC: DAA ED EDD, IBAN: DE42300606010007746598

Bopfinger Bank, BLZ 60069239, Kto. 11698004

Sepa: BIC: GENODES1BPF, IBAN: DE59600692390011698004